



DECLARACIONES DE SOCIEDADES INTERNACIONALES SOBRE EL USO DE PIRIDOXINA+DOXILAMINA EN EL EMBARAZO

Nausea and vomiting in Pregnancy

Jennifer R. Niebyl, M.D.

The New England Journal of Medicine

El 80% de las mujeres durante el embarazo tiene náusea y vómito¹.

ACOG: American College of Obstetricians and Gynecologists:

La recomendación de “tomar Vitamina B6 (piridoxina) + Doxilamina es seguro y efectivo, y debe ser considerado como 1ra línea de tratamiento” está basada en su evidencia científica consistente.²

US Department of Health and Human Services´ Agency for Healthcare Research and Quality:

La anterior recomendación ha sido evaluada por esta organización, la cual concluye en que el beneficio de la implementación de estas recomendaciones de guía podría lograr una reducción de la náusea y el vómito en el embarazo.³

SOGC: Society of Obstetricians and Gynecologists of Canada:

Publicó una Guía de Práctica Clínica en el manejo de la náusea y vómito en el embarazo en la cual se afirma que la “combinación de doxilamina/piridoxina debería ser el estándar de cuidado, ya que tiene la mayor evidencia para soportar su eficacia y seguridad”.¹

The Motherisk Program (Programa de riesgo materno), en el Hospital de niños enfermos en Toronto:

Recomienda la combinación de doxilamina y piridoxina como primera línea de tratamiento para el manejo de la náusea y vómito en el embarazo.⁴

Referencias

1. **Arsenault MY, Lane CA, MacKinnon CJ, et al.** SOGC clinical practice guidelines: the management of nausea and vomiting of pregnancy. *J Obstet Gynaecol Can* 2002; 24:817-31; quiz 832-3. Available at: <http://www.sogc.org/guidelines/public/120E-CPG-October2002.pdf> Archived (<https://web.archive.org/web/20130129190606/http://sogc.org/guidelines/public/120E-CPG-October2002.pdf>) 2013-01-29 at the Wayback Machine.
2. **American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG).** Nausea and vomiting of pregnancy. Washington (DC): American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG); 2004 Apr. 13 p. (ACOG practice bulletin; no.52).
3. **The National Guideline Clearinghouse.** Guideline Summary NGC-5719. Nausea and vomiting of pregnancy. 2007. Available at: <http://www.guideline.gov/content.aspx?id=10939> Archived (<https://web.archive.org/web/20121219024421/http://www.guideline.gov/content.aspx?id=10939>) 2012-12-19 at the Wayback Machine.
4. **Einarson, A; Maltepe, C; Boskovic, R; Koren, G (Dec 2007).** “Treatment of nausea and vomiting in pregnancy: an update algorithm”. *Can Fam Physician.* 53 (12): 2109-11.

Los conceptos no son responsabilidad de los autores y no comprometen las opiniones de Plamatech.